



Thuốc của cô

Thuốc của cháu

BỘ NẾP Y TẾ

PHÁC ĐỒ MỘT SỐ TAI NẠN THƯỜNG GẶP

HÓC SẮC

Nếu phát nhận trẻ ho sặc sụa, phỏng mắt, trợn mắt, khi thổi mũi, tìm tai của người bệnh với vật rơi vào đường thở của trẻ, vật bị co thắt hô hấp, sặc, sặc, tím tái, khạc ra máu, đờm, hơi thở...

XỬ TRÍ:

Khẩn trương đưa trẻ ra ngoài lập tức hô hấp nhân tạo, nếu trẻ còn tỉnh táo thì đặt trẻ nằm ngửa kê cao cổ và vỗ lưng người bệnh nhẹ.

Người cấp cứu một tay đặt xuống dạ người bệnh, tay kia bịt kín mũi miệng người bệnh, ấn mạnh xuống bụng trẻ ở trung 5 phút đến khi trẻ tỉnh táo.

Sau đó đưa trẻ bệnh viện.

XỬ TRÍ VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VÀ GÂY XƯƠNG

1. GÂY XƯƠNG
 Rửa sạch vết thương - Rửa sạch vết thương bằng nước sạch và rửa sạch bằng nước muối sinh lý.
LƯU Ý: GÂY XƯƠNG KÍN
 - Cách băng vết thương:
 - Băng từ ngoài vào trong.
 - Chỉ băng gây ngứa hơn cho bệnh nhân, ấn đầu ngón tay.
 - Không được để chuyển chỉ gây của trẻ.
 - Băng vết thương.
 - Đặt ngay về bệnh viện khi cần thiết.
 - Sau đó chuyển trẻ đến bệnh viện.

2. XỬ TRÍ:

- Rửa sạch vết thương và chuyển ngay đến cơ sở y tế cấp cứu.
 - Băng ngay cho trẻ.
 - Băng vết thương, tránh cho trẻ.
 - Sát trùng vùng quanh vết thương theo hướng dẫn của bác sĩ.
 - Rửa vết thương bằng nước muối 9%.
 - Băng lại bằng gạc vô khuẩn.

ĐUỐI VẬT

Cả vật thể không qua an toàn, đưa ngay trẻ đến bệnh viện ngay lập tức.
 - Không cho trẻ ăn uống.
 - Không cho trẻ uống nước.
 - Không cho trẻ đi vệ sinh.
 - Không cho trẻ tắm.

BÔNG

Không cho trẻ ăn uống, chỉ cho trẻ uống nước.
 - Không cho trẻ ăn uống.
 - Không cho trẻ đi vệ sinh.
 - Không cho trẻ tắm.

PHÒNG TRÁM:
 Không để trẻ chơi gần đồ chơi, các đồ chơi.
 Phòng ngừa, đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức.
 Trước khi đưa trẻ đến bệnh viện phải xử lý sơ cứu, sau đó đưa trẻ đến bệnh viện.



Cân nặng

Chiều cao

BMI

Ghi chú :

Tổng số trẻ 579			Cân nặng				Chiều cao				BT		SDD ₁		SDD ₂	
So sánh với đợt 2	Ổn định	SL	BT	CH	SDD ₁	SDD ₂	BT	CH	SDD ₁	SDD ₂	BT	SDD ₁	SDD ₂	BT	SDD ₁	SDD ₂
		%							1							
	Tăng	SL	30				26				32			6%		
	%		5.6%				4.7%									
	Giảm	SL		2	6					4			1			
	%			0.2%	60%					6.7%			100%			





Băng cá nhân

Thuốc của cô

Thuốc của cháu

HỌC SẠC
Nếu đột nhiên trẻ ho sặc sụa, phỏng má, trợn mắt, khó thở dữ dội, tim tái cần nghỉ ngay tới vật rơi vào đường thở của trẻ, vật lạ có thể là bột, sữa, viên thuốc, khay áo, đinh ghim, hạt đỗ, lạc....



XỬ TRÍ:

- Khẩn trương đốc đầu của trẻ xuống thấp lấy hết vật lạ trong mũi họng.
- Sau đó đặt trẻ nằm ngửa kê cao cổ và vai để dễ thở
- Nếu trẻ chưa thở được phải hà hơi thổi ngạt, xoa bóp tim ngoài lồng ngực.
- Người cấp cứu một tay bịt mũi trẻ, một tay kéo hàm dưới xuống, áp miệng vào mũi trẻ thổi thành hơi dài, trong 5 phút đến khi trẻ thở được.
- Sau đó đưa đến bệnh viện để theo dõi tiếp.

ĐUỐI NƯỚC

- Cởi nút thắt nhanh quần áo đốc đầu xuống thấp cho nước ra ngoài
- u ấm toàn thân
- Kiên trì hà hơi cho đến khi trẻ thở lại



- Đưa trẻ ra khỏi nước
- Cắt bỏ quần áo để u ấm cho trẻ uống
- Nếu vết bong bầm rộp loét, thấm khô che

PHÒNG TRÁNH:

- Không để trẻ chơi gần bể
- Phích nước sôi, đèn dầu
- Trước khi cho trẻ ăn cần



SL	30		26		32
%	5.6%		4.7%		1.0%
SL	2	6		8	1
%	0.2%	6%		12%	14.3%

